

Odesílatel (razítko, podpis):

 Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 - Rosice
 Tel. 466 644 000
 e-mail: interimun@interimun.cz
 Žádanka a informace k prováděným metodám: www.interimun.cz

IČP:

Odbornost:

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Pojišťovna:

Doplnující údaje:

Číslo pojištěnce / RČ:

 Pohlaví: M Ž Datum narození:

Kontakt na pacienta:

 Primární vzorek: krev sliny stolice jiný:

Datum a čas odběru vzorku:

Odběr provedl:

Buněčná imunita:
 Základní lymfocytární populace periferní krve (T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky)

Prosíme o současné vyšetření počtu leukocytů a dif. KO pro výpočet absolutních hodnot populací lymfocytů.

 Ingešční aktivita fagocytujících buněk (Po-Čt)

 Metabolická aktivita fagocytujících buněk (Burst test)

HLA-B27	ANA:	ANCA MPO (kvantitativně)	Periferní neuropatie:
Imunoglobuliny:	ANF (IF)	ANCA PR3 (kvantitativně)	Anti- neuronu IgG + IgM:
IgG	ANF (IF), při pozitivitě:	ANCA profil: MPO, PR3,	MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b
IgA	stanovit titr	BPI, elastáza, laktoferin, katepsin G	Paraneoplastický syndrom:
IgM	stanovit třídu Ig	Antifosfolipidy:	Paraneoplastické protilátky:
IgD	vyšetřit ENA blot	Anti- β-2-glykoprot. I IgG, IgM	Hu, Yo, Ri, amphiphysin, CV2, PNMA2,
IgE	vyšetřit ENA screen	Anti- kardiolipin IgG, IgM	recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr
IgG podtřídy (IgG1, 2, 3, 4)	Anti- dsDNA (IF)	Další autoprotilátky:	Celiakie:
IgG1	Anti- dsDNA (ELISA)	Anti- endoteliální buňky	Anti- transglutamináza IgA (ttgA)
IgG2	Anti- ssDNA	Anti- C1q	ttgA, při pozitivitě vyšetřit emys IgA
IgG3	Anti- nukleosomy	CIK, CCP, RF:	Anti- endomysium IgA (emys IgA)
IgG4	ENA screen	CIK-PEG	Anti- gliadin (deamidovaný) IgA
IgA podtřídy (IgA1, 2)	ENA screen, při pozitivitě	CIK-C1q	Anti- retikulín IgA
* IgA sekreční ve slinách	vyšetřit ENA profil	Anti- CCP	U deficitu celkového IgA:
Anti- IgA (ELISA)	ENA profil:	RF screening	Anti- gliadin (deamidovaný) IgG
Komplement:	Ro52+Ro60, SS-B, Scl-70, RNP/Sm,	RF ELISA IgG, IgA, IgM	Anti- transglutamináza IgG
C1q	RNP70, Sm, Jo-1, CENP-B	RF ELISA IgG	Anti- endomysium IgG
C2	Anti- SS-A/Ro ELISA	RF ELISA IgA	Anti- retikulín IgG
C3	Anti- SS-B/La ELISA	RF ELISA IgM	Alergologie:
C4	Anti- Scl-70 ELISA	Játra - autoprotilátky:	ECP
C5	Anti- RNP ELISA	Anti- mitochondrie (AMA; IF)	tryptáza
Aktivita komplementu	Anti- Sm ELISA	AMA IF, při pozitivitě stanovit titr	IgE specifické - ALEX
klasickou, alternativní a lekt. cestou	Anti- Jo-1 ELISA	Anti- M2 ELISA	IgE specifické - alergeny:
C1inhibitor	Anti- CENP-B ELISA	Anti- M2, M4, M9 blot	Alergeny vypište zde, nebo je
Další sérové proteiny:	Anti- DFS70 ELISA	Anti- LKM1 ELISA	zaškrtněte v alergologické žádance.
Alfa-1-antitrypsin	ENA blot: Ro52, SS-A, SS-B, Sm,	Jaterní blot:	
Alfa-2-makroglobulin	RNP/Sm, PCNA, nukleozomy, riboz. P	SLA/LP, LC1, LKM1, PGDH, AMA-M2,	IgG4 specifické: I1/včela
CRP	protein, Jo1, PM/ScI-100, Scl-70, CENP-B,	M2-3E, Sp100, PML, gp210, Scl-70,	IgG4 specifické: I3/vosa
Ceruloplasmin	dsDNA, histony, DFS70, AMA-M2	CENP-A, CENP-B, SS-A, Ro52	IgG4 další alergeny po domluvě:
Haptoglobin	Cytoplazma blot:	Anti- F-aktin (IF)	
Orosomukoid	AMA-M2, M2-3E, ribozomální P protein,	Anti- hladký sval (ASMA; IF)	
Prealbumin	Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52	Diabetes:	
Transferin	Myositida blot:	Anti- inzulín	
Diagnostika infekcí:	Mi-2α, Mi-2β, TIF-1γ, MDA5, NXP2,	Anti- GAD 65	
ASLO	SAE1, Ku, PM/ScI-100, PM/ScI-75,	Anti- ostrůvkové buňky (ICA)	
* H. pylori - antigen ve stolici	Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52	Anti- tyrozinofosfatáza (IA-2A)	
* Quantiferon-TB Plus (Po-Čt)	Systémová skleróza blot:	Anti- ZnT8	
Vakcinační protilátky:	Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155,	Perniciózní anémie:	
Anti-tetanový toxoid C.tetani	fibrillarín, NOR-90, Th/To, PM/ScI-100,	Anti- parietální buňky (IF)	Test aktivace bazofilů:
Anti-H.influenzae B	PM/ScI-75, Ku, PDGFR, Ro52	Anti- H+/K+ ATPáza (ELISA)	(středy, jiné dny po domluvě)
Anti-PCP S.pneumoniae	ANCA:	Anti- intrinsic (vnitřní) faktor	I1/včela
Nespec. střevní záněty:	ANCA (IF)	Ledviny - autoprotilátky:	I3/vosa
* Kalprotektin ve stolici	ANCA (IF), při pozitivitě:	Anti- glomer.baz.mem.(GBM)	Další alergeny po domluvě:
ASCA IgG, IgA	stanovit titr	Anti- baz. mem. tubulů (BMT)	
	vyšetřit ANCA profil	Anti- PLA2R+THSD7A	

Odběrovky BD Vacutainer:

Nesrážlivá krev: lithium heparin

Srážlivá krev (sérum)

Srážlivá krev: BD SSTII Advance

Nesrážlivá krev: EDTA

* speciální odběrovky, na vyžádání dodá laboratoř