

Žádanka o vyšetření samoplátce



verze 0324

Razítko, podpis indikujícího lékaře:

Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 - Rosice
Tel. 466 644 000
e-mail: interimun@interimun.cz
Žádanka a informace k prováděným metodám: www.interimun.cz

IČP:

Odbornost:

*Povinné položky

*Rodné číslo/č. pojištění:

*Jméno a příjmení:

Kód diagnózy:

*Kontakt na samoplátce:

email (pro zaslání faktury a výsledku):

Pokud nemáte email, uveďte poštovní adresu:

telefon:

Primární vzorek: X sliny

*Datum a čas odběru vzorku:

*Podpis samoplátce:

Požadované vyšetření: Peptest

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Aktuální cena testu viz www.interimun.cz / Přehled vyšetření / Peptest
Fakturu zašleme samoplátci do emailu. Výsledky zašleme po obdržení platby na účet. Pokud je na žádance uvedeno razítko indikujícího lékaře, výsledky zašleme i lékaři.

Žádanka o vyšetření samoplátce



verze 0324

Razítko, podpis indikujícího lékaře:

Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 - Rosice
Tel. 466 644 000
e-mail: interimun@interimun.cz
Žádanka a informace k prováděným metodám: www.interimun.cz

IČP:

Odbornost:

*Povinné položky

*Rodné číslo/č. pojištění:

*Jméno a příjmení:

Kód diagnózy:

*Kontakt na samoplátce:

email (pro zaslání faktury a výsledku):

Pokud nemáte email, uveďte poštovní adresu:

telefon:

Primární vzorek: X sliny

*Datum a čas odběru vzorku:

*Podpis samoplátce:

Požadované vyšetření: Peptest

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Aktuální cena testu viz www.interimun.cz / Přehled vyšetření / Peptest
Fakturu zašleme samoplátci do emailu. Výsledky zašleme po obdržení platby na účet. Pokud je na žádance uvedeno razítko indikujícího lékaře, výsledky zašleme i lékaři.

Pokyny k odběru vzorku slin pro Peptest


Odběr se provádí do speciální k tomu určené zkumavky s roztokem kyseliny citronové. Tuto zkumavku si vyzvedněte v laboratoři nebo u lékaře, který Vám vyšetření doporučil.

Odběr slin proveďte ráno na lačno ihned po probuzení. Před odběrem nejezte, nepijte, nekuřte a neprovádějte ústní hygienu. Odběr neprovádějte při krvácejících nebo zánětlivých afekcích v ústech. Další varianta odběru je v období, kdy pociťujete příznaky refluxu, tedy silný kašel, pálení žáhy apod.

48 hodin před odběrem: Neužívejte léky s obsahem alginátu (např. Gaviscon), antacida, nepijte zásaditou / alkalickou vodu / minerálku.

24 hodin před odběrem: Pro úspěšný odběr potřebného množství slin je doporučeno pít dostatek tekutin.

Odběr provádějte ve vzpřímené poloze:



1. Odkášlejte si
2. Vyplivněte sliny (bez hlenu) do zkumavky s roztokem kyseliny citronové.
3. Opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce 1 ml vzorku. Vzorek by měl sahat těsně pod rysku na spodní části samolepky na zkumavce. Zkumavku v žádném případě neplňte nad úroveň rysky.
4. Našroubujte víčko na zkumavku. Zkumavku dobře protřepejte, aby došlo k promíchání vzorku s činidlem ve zkumavce.
5. Na zkumavku napište datum a čas odběru. Zkumavku se vzorkem a žádanku doručte co nejdříve od odběru do laboratoře, nebo po domluvě lékaři. Vzorek je do doručení do laboratoře nutné skladovat v chladničce při 2-8°C.

INTERIMUN s.r.o., Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 – Rosice, tel.+420 466 644 000, e-mail: interimun@interimun.cz, www.interimun.cz

Pokyny k odběru vzorku slin pro Peptest


Odběr se provádí do speciální k tomu určené zkumavky s roztokem kyseliny citronové. Tuto zkumavku si vyzvedněte v laboratoři nebo u lékaře, který Vám vyšetření doporučil.

Odběr slin proveďte ráno na lačno ihned po probuzení. Před odběrem nejezte, nepijte, nekuřte a neprovádějte ústní hygienu. Odběr neprovádějte při krvácejících nebo zánětlivých afekcích v ústech. Další varianta odběru je v období, kdy pociťujete příznaky refluxu, tedy silný kašel, pálení žáhy apod.

48 hodin před odběrem: Neužívejte léky s obsahem alginátu (např. Gaviscon), antacida, nepijte zásaditou / alkalickou vodu / minerálku.

24 hodin před odběrem: Pro úspěšný odběr potřebného množství slin je doporučeno pít dostatek tekutin.

Odběr provádějte ve vzpřímené poloze:



1. Odkášlejte si
2. Vyplivněte sliny (bez hlenu) do zkumavky s roztokem kyseliny citronové.
3. Opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce 1 ml vzorku. Vzorek by měl sahat těsně pod rysku na spodní části samolepky na zkumavce. Zkumavku v žádném případě neplňte nad úroveň rysky.
4. Našroubujte víčko na zkumavku. Zkumavku dobře protřepejte, aby došlo k promíchání vzorku s činidlem ve zkumavce.
5. Na zkumavku napište datum a čas odběru. Zkumavku se vzorkem a žádanku doručte co nejdříve od odběru do laboratoře, nebo po domluvě lékaři. Vzorek je do doručení do laboratoře nutné skladovat v chladničce při 2-8°C.

INTERIMUN s.r.o., Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 – Rosice, tel.+420 466 644 000, e-mail: interimun@interimun.cz, www.interimun.cz